



Str.I.C.Bratianu nr.29  
0245217138  
Loc.Targoviste, Jud.Dambovita

Tel/fax:

Nr. 34 din 24.07.2017

## BULETIN DE AVERTIZARE

### MAR

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/daunatorului: rapan, faina monilioza, viermele merelor, afide, molii miniere, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere va recomandam efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:  
- condiții optime de temperatură și precipitații;

1. Flint Plus 64 WG – 1,875 kg/ha (0,125%) + Proteus OD 110 – 0,75 l/ha (0,05%)
2. Systhane Forte – 0,3 l/ha (0,02%) + Dithane M45 – 3 kg/ha (0,2%) + Voliam Targo – 1,1 l/ha (0,075%)
3. Topsin 70 WDG – 1,05 kg/ha (0,07%) + Captan 80 WDG – 2,25 kg/ha (0,15%) + Calypso 480 SC – 0,3 l/ha (0,02%)
4. Topsin 500 SC – 2,1 l/ha (0,14%) + Merpan 80 WDG – 2,25 kg/ha (0,15%) + Karate Zeon – 0,225 l/ha (0,015%)

Pe solele unde se înregistrează atac de acarieni va recomandam să adăugați la variantele de mai sus unul din acaricide **Kanemite - 0,625 l/ha sau Milbeknock – 0,75 l/ha (0,05%)**

Tratamentul se va aplica în perioada: **25-29.07.2017**

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1500 l.

\* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ (puteți face și alte amestecuri cu produsele recomandate variantele de mai sus).

\*\* Va rugăm să respectați dozele și omologările recomandate.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de **înflorire**.

Intocmit,  
ing. Serban Victoria

